

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ГЕНТАМОКС для лечения бактериальных инфекций
у свиней и крупного рогатого скота

Организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.» /«Laboratorios Hipra,
S.A.», Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания

Номер регистрационного удостоверения:724-3-12.12-0809№ПВИ-3-7.6/02018

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
ГЕНТАМОКС (GENTAMOX).

Международное непатентованное наименование: амоксициллина тригидрат и гентамицина сульфат.

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

Гентамокс в 1 мл в качестве действующих веществ содержит 150 мг амоксициллина в форме тригидрата и 40 мг гентамицина в форме сульфата, а качестве вспомогательных веществ – 52,5 мг бензилового спирта, 1 мг сорбитанолеата и триглицериды – до 1 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию светло-желтого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения и транспортирования - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать Гентамокс по истечении срока годности.

4. Гентамокс расфасован по 100 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными колпачками. Флаконы упакованы в индивидуальные картонные коробки, в которую вкладывают инструкцию по применению.

5. Гентамокс хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

6. Гентамокс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Гентамокс относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам.

10. Комбинация амоксициллина и гентамицина обладает широким антибактериальным спектром, включающим грамположительные микроорганизмы (в том числе *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., и *Corynebacterium*) и грамотрицательные микроорганизмы (в том числе *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp. и *Pseudomonas* spp.).

Амоксициллин и гентамицин хорошо всасываются из места инъекции и проникают в большинство органов и тканей организма животного. Максимальная концентрация амоксициллина достигается через 1 час после инъекции и гентамицина через 30 минут. Терапевтические концентрации сохраняются в течение 24 часов. Выводятся антибиотики из организма животного преимущественно с мочой.

Гентамокс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Гентамокс с лечебной целью применяют свиньям при колибактериозе, метрите, мастите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной этиологии, крупному рогатому скоту при мастите, метрите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной этиологии.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животных к пенициллинам и аминогликозидам, а также заболевание почек.

13. При работе с Гентамоксом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применять Гентамокс в период беременности животных.

15. Гентамокс вводят внутримышечно один раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг массы животного в течение 3 суток.

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают. При больших объемах введения Гентамокс рекомендуется инъекцию проводить в несколько мест для улучшения всасывания лекарственного препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Гентамокс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакции животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животных на месте инъекции возможно развитие отека, который рассасывается самопроизвольно в течение 1-2 суток.

18. Гентамокс не следует применять вместе с бактериостатическими антибиотиками.

19. Особенности действия при первом введении препарата и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата следует немедленно возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 30 суток после последнего введения Гентамокс. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко можно использовать для пищевых целей не ранее, чем через минимум 3 суток после последнего применения лекарственного препарата. Молоко, полученное до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Лабораториос Хипра С.А.», адрес: Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания/ «Laboratorios Hipra, S.A.», address Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

«Лабораториос Хипра С.А.», адрес: Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания/ «Laboratorios Hipra, S.A.», address Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain