

КОРИПРАВАК (CORIPRAVAC)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины КОРИПРАВАК против инфекционного ринита птиц инактивированной

Организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.», (Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: КОРИПРАВАК/ CORIPRAVAC.

Международное непатентованное наименование: Вакцина против инфекционного ринита птиц инактивированная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию беловатого цвета. При хранении допускается расслоение эмульсии, однородность которой восстанавливается при взбалтывании.

Вакцина расфасована по 500 мл (1000 иммунизирующих доз) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. К каждому флакону прилагается инструкция по применению вакцины на русском языке.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, темном месте при температуре от 2 °C до 8 °C. Замораживание вакцины не допускается.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением

целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, а также остатки вакцины, не использованные в течение 8-10 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у птиц к возбудителям инфекционного ринита в течение 28 дней после введения, который сохраняется не менее 60 недель.

В одной иммунизирующей дозе (0,5 мл) содержится не менее 5×10^9 инактивированных микробных клеток каждого штамма *Avibacterium paragallinarum*:

серотип А (штамм 1753), серотип В (штамм 1755); серотип С (штамм 1756).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина КОРИПРАВАК предназначена для профилактики инфекционного ринита птиц в птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

9. Запрещено вакцинировать клинически больную и/или ослабленную птицу.

10. Вакцинации подлежит птица в возрасте 10 недель и ревакцинации в возрасте 16 недель, но не позднее чем 4 недели до начала яйцекладки. Вакцину вводят внутримышечно в грудные мышцы в дозе 0,5 мл на птицу.

Перед применением вакцину заблаговременно выдерживают при температуре 15-25 °C до достижения указанной температуры. Во время проведения вакцинации флакон с вакциной периодически встряхивают для восстановления однородности эмульсии.

Для вакцинации используют одноразовые стерильные шприцы и иглы, или многоразовые шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 минут. Место введения вакцины обрабатывают 70% спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

11. Симптомов появления инфекционного ринита птиц или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Вакцина не вызывает клинически выраженных поствакцинальных реакций.

13. Следует избегать нарушения сроков проведения иммунизации, что может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики инфекционного ринита птиц.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

15. Информация о нарушении безопасности или эффективности данной вакцины при использовании с другими препаратами отсутствует. Решение о применении данной вакцины до или после любого другого ветеринарного препарата должно приниматься на индивидуальной основе.

16. Мясо, продукты убоя и яйцо, полученное от привитой птицы, реализуют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, принимающие участие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы или марлевые повязки). После работы следует принять душ, тщательно вымыть руки с мылом, переодеться. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи. Во время вакцинации запрещается прием воды и пищи, курение.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством чистой воды. После работы с вакциной вымыть руки с мылом. При случайном введении вакцины человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель «Laboratorios Hipra, S.A.»/«Лабораториос Хипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Инструкция по применению вакцины КОРИПРАВАК против инфекционного ринита птиц инактивированной разработана «Лабораториос Хипра С.А.», Испания, Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ "ВГНКИ".



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com