

Рассмотрено и одобрено  
на заседании Ветбиофармсовета  
«27» марта 2008 г  
Протокол № 41



## ИНСТРУКЦИЯ по применению порошка «Ампробел-Р»

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Порошок Ампробел-Р (Pulvis Amprobelum-R)  
1.2 Представляет собой аморфный или мелкогранулированный порошок от белого до коричневато-серого цвета, хорошо растворим в воде.  
1.3 В 1,0 г препарата содержится 0,3 г ампролиума гидрохлорида и наполнителя до 1,0 г.  
1.4 Препарат выпускают в пакетах из ламинированной фольги по 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 кг и в мешках бумажных по 5,0; 10,0; 20,0; 25,0 кг  
1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя по списку Б в сухом, хорошо вентилируемом темном помещении при температуре от 0<sup>0</sup> С до плюс 25<sup>0</sup>С.  
1.6. Срок годности 3 (три) года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

### 2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Порошок Ампробел-Р активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*, *E. Praecox*, *E. zurnii*, *E. Ninakohlyakimovi*, *E. bovis*.  
2.2 Ампролиум, входящий в состав препарата, угнетает развитие эймерий на стадии шизогонии второй генерации. Является антагонистом витамина В<sub>1</sub>.  
2.3 При оральном введении ампролиум практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, проявляя противоэймериозное действие на слизистых и подслизистых оболочках. Выводится ампролиум в неизмененном виде с фекалиями. Препарат малотоксичен.

### 3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Порошок Ампробел-Р применяют для профилактики и лечения эймериоза у цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка, племенной птицы, телят и овец.  
3.2 Бройлерам с профилактической целью препарат применяют с 3-5 дневного возраста с кормом или водой в дозе 400 г препарата на одну тонну корма или воды в течение периода выращивания; с лечебной в течение 5 дней в дозе 800 г препарата на одну тонну корма или воды (250 мг/кг корма или литр воды по ДВ).  
3.3 Ремонтному молодняку с профилактической целью препарат задают с 3-5 дневного возраста до 16 недельного возраста в дозе 400 г препарата на одну тонну корма; с лечебной целью в течение 5 дней в дозе 800 г препарата на тонну корма. С питьевой водой порошок «Ампробел-Р» применяют с 3-5 дневного возраста до 21 дня жизни в дозе 400 г препарата на 1000 л питьевой воды; с лечебной целью в течение 5 дней в дозе 800 г препарата на 1000 л питьевой воды. Указанный раствор готовится из расчета потребления на одни сутки.  
3.4. Молодняку крупного рогатого скота и овцам: для лечения при эймериозе порошок «Ампробел-Р» назначают в дозе 0,04 г препарата на кг массы животного 1 раз в день. Курс лечения 5 дней. В тяжелых случаях дозу препарата следует удвоить.  
Порошок «Ампробел-Р» можно задавать животным с питьевой водой, пойлом, заменителем молока. Для этого 24 г препарата растворяют в 300,0 см<sup>3</sup> воды или жидкого корма. При применении с комбикормом необходимо 24 г препарата смешать с одним кг

комбикорма и задавать внутрь из расчета 5 г смеси на кг массы животного ежедневно в течение 4-5 дней.

Для профилактики эймериоза молодняку крупного рогатого скота порошок «Ампробел-Р» задают внутрь в дозе 0,02 г/кг массы животного в течение 21 дня; овцам внутрь в дозе 0,04 г/кг массы животного в течение 5 дней.

3.5 В период проведения лечебно-профилактических мероприятий раствор препарата должен являться для птицы единственным источником питьевой воды.

3.6 Для обеспечения равномерного распределения препарата, суточную дозу смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

3.7 Эффективность порошка «Ампробел-Р» не снижается при включении в корм антибиотиков, минеральных веществ, витаминов.

3.8 В рекомендуемых дозах побочного действия препарата не выявлено.

3.9 Убой птицы и животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после прекращения применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока мясо может быть использовано на корм плотоядным.

#### **4 МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ**

- 4.1. Все работы с препаратом необходимо проводить в спецодежде.
- 4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
- 4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой

#### **5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19<sup>а</sup> и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высыпают невскрытую упаковку препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

Препарат выпускает ООО «Рубикон», г. Витебск.

Инструкция разработана сотрудниками кафедр фармакологии и токсикологии (доценты Петров В.В., Ятусевич И.А.), паразитологии (ассистент Петрукович В.В.) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

Доцент кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ»

В.В. Петров

